



Possibili stack con i gel PTC

Anabolic Instant Stack

Combinazione di S-ZOL e P-BOL, due steroidi ad azione prevalentemente anabolizzante, che non provocano ritenzione idrica né aumento lipidico e creano esclusivamente massa muscolare di alta qualità.

Raccomandazioni per l'assunzione: ½ bustina di gel S-ZOL e P-BOL ½ ora prima della colazione e la rimanente ½ bustina dopo 12 ore, ½ ora prima di un pasto

Shredded-Rip Stack

Combinazione di S-ZOL e P-BOL, due androgeni da moderati a forti con elevato effetto anabolizzante. Ideale per mantenere forza e massa muscolare durante una dieta. S-ZOL svolge una leggera azione diuretica, consentendo di migliorare notevolmente la forma fisica con un regolare utilizzo.

Raccomandazioni di assunzione: 1 bustina di gel S-ZOL prima dell'addestramento e P-BOL soltanto i giorni senza addestramento (min. 2 giorni alla settimana) ½ ora prima della colazione e la rimanente ½ bustina dopo 12 ore, ½ ora prima di un pasto



„Strength and Mass Stack Extreme“

Stack androgeno e principalmente anabolizzante di Methabolon-BLOCKS e S-ZOL. Questa combinazione genera una struttura della massa muscolare di alta qualità insieme ad un ritengo moderato dell'acqua e una ritenzione di grasso così come un aumento intenso di resistenza.

Raccomandazioni di assunzione: 2 M-Block ridurre e ½ bustina di gel S-Zol prima della oppure insieme con la colazione e 2 M-Block ridurre e la rimanente ½ bustina di gel S-Zol dopo 12 hore insieme con un pasto.